

トウヒ群落下層植生の変化 (1972年と2002年)

トウヒ群落コケタイプ

生育型	種名	平均被度% <sup>注)</sup>	
		1972年	2002年
<b>低木層</b>			
針葉樹	ウラジロモミ	0.02	-
針葉樹	ヒノキ	0.03	-
針葉樹	トウヒ	1.27	0.03
針葉樹	コメツガ	0.03	0.03
<b>草本層</b>			
草本層	イトスゲ	5.35	0.07
草本層	ミヤコザサ	1.62	0.03
針葉樹	ウラジロモミ	0.05	0.03
針葉樹	トウヒ	0.07	0.07
低木層	ミヤマシキミ	2.52	5.87
<b>コケ層</b>			
	コケ層の 平均植生率(%)	68.3	15.0

赤：1972年と比較して2002年に平均被度%が減少

青：1972年と比較して2002年に平均被度%が増加

- ・1972年調査地点：No.7,12,13,31,34,38 (井手・亀山、1972年)
- ・2002年調査地点：No.H3,H5

注) 平均被度%

被度合計 (被度を%に換算 (被度r:0.01、被度+:0.1、被度1:7.5、被度2:17.5、被度3:37.5、被度4:62.5、被度5:87.5)) /地点数