

ブナ-ウラジロモミ群落の植生の変化 (1972年と2001年)

生育型	種名	平均被度% <sup>注)</sup>	
		1972年	2002年
<b>高木層</b>			
広葉樹	ヒメシャラ	3.75	0.20
針葉樹	ウラジロモミ	8.33	3.63
広葉樹	ブナ	24.17	27.83
針葉樹	ヒノキ	1.35	17.57
<b>低木層+</b>			
<b>草本層</b>			
広葉樹	ヒメシャラ	1.30	0.01
草本類	スズタケ	54.17	6.71
針葉樹	ウラジロモミ	2.53	0.86
広葉樹	コハウチワカエデ	0.05	0.02
草本類	イトスゲ	0.03	0.02
低木種	ミヤマシキミ	5.42	22.4
広葉樹	ブナ	0.07	0.36

赤：1972年と比較して2002年に平均被度%が減少

青：1972年と比較して2002年に平均被度%が増加

- ・1972年調査地点：No.22,23,24,30,63,64 (井手・亀山、1972年)
- ・2001年調査地点：「環境省、2001年」の植生調査地点より、現況植生区分「ブナ-ウラジロモミ群落」内に該当する地点を抜粋

注) 平均被度%

被度合計〔被度を%に換算(被度r:0.01、被度+:0.1、被度1:7.5、被度2:17.5、被度3:37.5、被度4:62.5、被度5:87.5)〕/地点数