

トウヒ群落下層植生の変化（1972年と2002年）

トウヒ群落ササ密タイプ

生育型	種名	平均被度% ^{注)}	
		1972年	2002年
低木層			
針葉樹	トウヒ	1.68	-
針葉樹	ウラジロモミ	0.03	0.02
針葉樹	コメツガ	0.84	1.27
針葉樹	ヒノキ	0.02	4.18
草本層			
草本層	イトスゲ	10.01	0.07
草本層	スズタケ	0.83	0.02
針葉樹	コメツガ	0.02	0.02
草本層	ミヤコザサ	62.50	67.50
針葉樹	トウヒ	0.08	0.10
低木層	ミヤマシキミ	3.62	8.80
針葉樹	ウラジロモミ	0.03	0.08
針葉樹	ヒノキ	0.02	0.07
コケ層			
コケ層の 平均植被率(%)		18.9	12.4

赤：1972年と比較して2002年に平均被度%が減少

青：1972年と比較して2002年に平均被度%が増加

・1972年調査地点：No.1,2,3,9,10,11,33,37,54（井手・龜山、1972年）

・2002年調査地点：No.H6,H8,S10,S11,S12,S14

注) 平均被度%

被度合計〔被度を%に換算（被度r：0.01、被度+：0.1、被度1：7.5、被度2：17.5、被度3：37.5、被度4：62.5、被度5：87.5）〕/地点数